



**Komunikat
Powiatowego
Lekarza
Weterynarii**

Choroba guzowatej skóry

W związku z pojawieniem się ognisk choroby guzowatej skóry u bydła na terenie Włoch i Francji, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce informuje:

Choroba guzowatej skóry to wirusowa, zakaźna choroba bydła i bawołów wodnych, którą wywołuje lumpy skin disease virus (LSDV; Capripoxvirus; Poxviridae).

Źródłem zakażenia są zwierzęta ze zmianami skórными, ślina, wyciek z nozdrzy i oczu, mleko, nasienie, zanieczyszczona wirusem karma i woda, oraz mięśnie, śledziona i węzły chłonne padłych zwierząt. Mechanicznym przenosicielem wirusa są owady krwiopijne, muchy, kleszcze. Okres wylęgania choroby trwa 4–14, a nawet 28 dni.

Objawy: podwyższenie temperatury ciała powyżej 41°C, która utrzymuje się od 4 do 14 dni, najczęściej przez 7 dni, zwierzęta tracą apetyt, często leżą, występuje łzotok, ślinotok, śluzoworopny wypływ z nosa i worka spojówkowego, spada mleczność, rozwija się zapalenie lub zmętnienie rogówki bądź ślepotą, pojawiają się okrągłe twarde guzki o średnicy od 0,5 do 7 cm wystające ponad powierzchnię skóry otoczone strefą przekrwienia, sierść nad guzkami jest nastroszona. Najwięcej guzków jest na głowie wokół nozdrzy i oczu, karku, szyi, mostku, tułowiu i kończynach, gruczoł mlekowy, okolicy krocza i moszny. Powierzchnowe węzły chłonne są powiększone, kończyny, okolica mostka i okolica narządów płciowych są obrzękłe. Guzki mogą występować na śluzówce jamy nosowej, jamy ustnej, przedżołądkach, jelitach, tkance podskórnej, mięśniach, oskrzelach i w płucach. Guzki pękają, pojawiają się nadżerki i owrzodzenia, z których sączy się wydzielina zawierająca wirus. Wydzielina zasycha, tworzą się strupy, a po ich odpadnięciu blizny. Mogą pojawić się owrzodzenia spojówek, śluzawicy, nozdrzy, śluzówki jamy ustnej, gardła, tchawicy, przełyku i trawieńca. Powikłaniem choroby mogą być infekcje bakteryjne prowadzące do powstawania rozległych ropni, zaburzenia w rozrodzie, zapalenie płuc, duszność i kulawizna. Przy braku powikłań choroba trwa 4–12 tygodni. Mogą występować zakażenia śródmaciczne płodów i rodzenie się cieląt ze zmianami typowymi dla choroby guzowatej.

Zapobieganie: kwarantanna nowo zakupionych zwierząt, należy unikać wprowadzania do stada zwierząt nieznanego pochodzenia lub z terenów endemicznych, likwidacja zwierząt chorych i kontaktujących się z chorymi, utylizacja zwłok, oczyszczenie i dezynfekcja obór oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi zwierząt, bioasekuracja, ścisła izolacja zwierząt chorych, kontrola nasienia, zwalczanie wektorów, szczepienie, leczenie powikłań bakteryjnych, kontrola obrotu zwierzętami, handlu skórą i tuszami.

W Polsce jest to choroba zwalczana z urzędu, a szczepienie jest zabronione. Każde podejrzenie wystąpienia choroby guzowatej skóry należy niezwłocznie zgłosić Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce

**POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Hajnówce**

Joanna Piekut-Geniusz